

MANEIG HOSPITALARI DE LA COVID-19.

Versió 1. (Gener 2024)

INDICACIONS de CRIBRATGE de SARS-CoV-2

- Pacients amb **simptomatologia** suggestiva de COVID-19: febre o febreta, quadre catarral, tos o dificultat respiratòria, dolor muscular o articular inexplicat, fatiga, dolor abdominal, vòmits, diarrea, alteracions de l'olfacte o gust, odinofàgia, cefalea, irritabilitat en el lactant...
- Pacients **asimptomàtics** però candidats a ingrés en els Serveis d'Oncologia o Hematologia, inclús si són perifèrics, des de Urgències, CEX, H de dia, o ingrés programat (vàlids 72hores abans de l'ingrés).
- * **Els pacients que ja han sofert COVID** amb confirmació microbiològica durant els **últims 3 mesos no tenen indicació de cribratge** excepte si la clínica es molt suggestiva.

MANEIG DE LA PCR NO CONCLUENT

- Si el resultat de la PCR és no conclouent es procedirà a repetir una segona PCR. A la petició fer constar en el camp "motiu de la petició" o en l'orientació diagnòstica "PCR PRÈVIA NO CONCLUENT"
- Si el resultat de la 2a PCR continua sent no conclouent es procedirà a instaurar mesures d'aïllament per sospita de COVID i tornar a repetir una 3a mostra a les 24 hores. Si la 3a PCR continua sent no conclouent i el pacient està asimptomàtic es pot considerar com PCR residual i no precisarà aïllament.

DURACIÓ de l'ÀILLAMENT DEL PACIENT AMB COVID

Des del punt de vista de la gestió de llits en pacients amb COVID o antecedents recents de COVID en cas d'ingrés, la duració de les mesures d'aïllament es mantindran segons la clínica:

CLÍNICA COVID	DURACIÓ ÀILLAMENT
Pacients asimptomàtics	7 dies des de la PCR
Pacients amb simptomatologia lleu-moderada	Almenys durant 7 dies des de la PCR i hagin passat almenys 72 hores asimptomàtics i afebrils (sense ús d'antitèrmics)
Pacients amb pneumònia i simptomatologia greu (compleix 2 dels 3 criteris següents: SatO ₂ <94% a l'aire, FR >24rpm, PaO ₂ /FiO ₂ <300mmhg) o immunodeprimits	Almenys durant 21 dies des del diagnòstic per PCR i hagin passat almenys 72 hores asimptomàtics i afebrils (sense ús d'antitèrmics)

Els pacients asimptomàtics que hagin de ser traslladats a centres soci-sanitaris de la nostra àrea, en la actualitat ja no precisen la realització de PCR ni TAR abans de l'alta per fer el trasllat.

MANEIG DEL CONTACTE ESTRET DE COVID-19

Es considera contacte estret el pacient que ha compartit habitació amb un cas positiu durant **més de 24 hores**.

En aquest cas s'aplicaran mesures d'aïllament durant 5 dies i es realitzaran la PCR d'aspirat nasofaringe el dia del contacte (dia 0) i el 3r i 5é dia del contacte.

Si una de les 2 PCR fos positiva es traslladarà a àrea COVID. Si les tres proves són negatives, es podrà procedir a desaïllar el pacient.

ALGORITME D'ACTUACIÓ CAS DE SARS-COV-2 INTRAHOSPITALARI

