

#DonaSantPau



FAQS INFECCIÓ PER SARS COV2 I EMBARÀS

Estic embarassada i tinc COVID, li influeix al meu bebé?

L'evidència actual de l'efecte de la infecció per COVID sobre l'embaràs és encara escassa però de moment no s'ha relacionat amb malformacions fetals.

Si vaig tenir infecció per COVID abans de quedar-me embarassada, ¿influeix en el meu embaràs actual?

Si la infecció va ser prèvia a l'embaràs, no sembla tenir efecte sobre la gestació actual

Sóc personal sanitari i estic embarassada, hauria de vacunar-me?

L'evidència actual sobre la vacuna de la COVID és molt escassa i no s'ha dut encara cap estudi sobre dones embarassades.

L'administració de la vacuna ha de ser individualitzada, aconsellant-se en dones que treballen en 1era línia de COVID.

Si ja t'has posat la 1era dosi no t'has de preocupar ja que el tipus de vacuna és compatible amb l'embaràs i no afecta el fetus.

He de fer algun tractament quan em diagnostiquin de COVID?

Si tens símptomes i són lleus (mal de cap, tos lleu, febrícula) pots prendre paracetamol oral si ho necessites.

Si els teus símptomes empitjoren (dificultat respiratòria, febre elevada) has d'acudir a Urgències Generals de l'hospital per ser valorada.

Davant de qualsevol tipus de clínica es recomana l'administració de Enoxaparina subcutània (punxada) cada dia durant 15 dies (al menys) des del dia de la PCR.

Si vaig tenir COVID en 3r trimestre, em repetireu la PCR quan ingressi de part?

Si l'última PCR COVID és de fa més de 3 mesos es repeteix la prova.

Ingresso de part, es realitza la PCR COVID de manera sistemàtica? I als acompanyants?

Es realitza a TOTES les dones que ingressen al nostre servei una PCR de COVID. En el cas dels acompanyants, es realitza un Test d'Antígens.

Si la meva parella i jo som contacte COVID i em poso de part, pot la meva parella estar amb mi durant el part?

**En el moment de l'ingrés es realitza un test d'Antígens a l'acompanyant, en el cas en que sigui positiu, aquesta persona no podrà quedar-se durant el treball de part.
No obstant això podràs estar acompanyada per una altra persona mentre sigui negativa.**

En cas de cesària s'aplicarà el mateix protocol.

Estant de part, he de portar la mascareta durant els espoderaments actius?

Si la PCR COVID d'ingrés és negativa i no presents símptomes compatibles amb infecció per COVID, es permet la retirada de la mascareta durant el període d'espoderaments actius.

Si sóc positiva en el moment de el part, ingreso en una altra planta?

Si pareixes a Sant Pau estaràs a la mateixa planta que les altres puèrperes però estaràs aïllada.

Acabo de parir i sóc COVID positiva, què he de fer?

**En 1er lloc hauràs de mantenir un aïllament mentre estiguis ingressada (no podràs sortir de l'habitació). La persona que t'acompanyi tampoc.
Si estàs asimptomàtica o tens símptomes lleus, el nadó podrà romandre amb tu a l'habitació.
Si el teu nadó necessita ingrés a la UCI neonatal, no podràs tenir accés a la UCI.
No es contraindica la lactància materna.
Quan marxis d'alta hauràs de completar l'aïllament com a mínim 10 dies.
Hauràs seguir amb el tractament d'enoxaparina mínim 15 dies.**