

Si el/la niño/a usa un infusor

El infusor es un recipiente con un globo en su interior que puede contener todo tipo de medicación. Se utiliza cuando queremos administrar una medicación concreta a un ritmo lento y constante. Existen de muchos tipos y formas, pero todos funcionan igual.



¿Cómo administrar medicación?

- Sigue siempre las instrucciones del profesional referente de medicina o enfermería.
- Limpia bien las conexiones a la vía antes de conectar la jeringa.
- Una vez administrado el fármaco, limpia la vía con 0,3ml de suero fisiológico.


❗ **Ante cualquier complicación o signo de alerta, avisa al equipo de Paliativos Pediátricos o acude a Urgencias.**

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Cuidados de la vía subcutánea a domicilio



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

¿Qué es una vía subcutánea?

Es un tubo pequeño y muy flexible que se coloca debajo de la piel para poder administrar medicación o líquidos sin necesidad de otros accesos.


Las medicaciones administradas por esta vía se van absorbiendo muy lentamente y generan el mismo efecto que si las administrásemos por otro tipo de vía.

La vía subcutánea o también llamada palomita es menos agresiva para el/la niño/a y le evita pinchazos frecuentes. Le proporciona autonomía y es sencilla de utilizar. Tiene menos complicaciones y efectos secundarios que otro tipo de accesos.



¿Cómo y dónde se coloca?

La palomita se ha de colocar en lugares donde haya suficiente tejido subcutáneo. Los más habituales son los muslos o el abdomen. El brazo sólo se utilizará en caso de niños/as mayores de 2 años.



¿Cómo fijar la vía subcutánea?



Colocaremos sobre la vía un apósito transparente para poder controlar su estado y la piel a diario.



El tubo restante puede fijarse a la piel o a la ropa para evitar tirones. Si no hay incidencias, la vía puede durar de 5 a 7 días.

¿Qué debo vigilar?



Si la zona de punción está húmeda, revisa que todas las conexiones están bien colocadas y avisa al equipo de enfermería.



En el caso de que haya presencia de sangre en la palomita, avisa al equipo de enfermería.



Vigila signos de alerta como inflamación, enrojecimiento o aumento de la temperatura local. Si se producen, avisa al equipo de enfermería.

Vida diaria



Puedes realizar la higiene habitual del/la niño/a, con cuidado de no mojar directamente el lugar donde está la vía. En caso de hacerlo, se deberá cambiar el apósito.



Podrá realizar las actividades habituales siempre con cuidado de no dar tirones o golpes en la zona de punción.