

Complicacions



VÒMITS

Col·loca a la criatura de costat i evita que el vòmit entri per la cavitat de la traqueostomia. Realitza una aspiració del vòmit.



IRRITACIÓ DE L'ESTOMA

Si observes que la pell del voltant està vermella, inflamada o calenta, avisa a infermeria.



MALA OLOR

Si perceps mala olor de l'estoma o de la cànula, avisa a infermeria.



SORTIDA ACCIDENTAL DE LA CÀNULA

Introdueix suaument una nova cànula, sense forçar. Si el/la nen/a ho requereix, administra oxigen.

❗ Davant qualsevol d'aquestes complicacions comunicar a l'equip de Pal·liatius Pediàtrics o acudeix a Urgències.

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Cures de la traqueostomia en el domicili




Què és una traqueostomia?

Certes malalties afecten el mecanisme de la respiració dels infants i precisen de via d'entrada d'aire que no sigui el nas ni la boca. Aquesta via d'entrada és la traqueostomia.


Una traqueostomia és un orifici (estoma) que es realitza en la tràquea de l'infant per a comunicar-la amb l'exterior i permetre-li respirar a través d'ell.

En aquest estoma es col·loca un tub que permet l'entrada i sortida d'aire.



Tipus

En funció de la finalitat i de la durada de la traqueostomia existeixen diferents tipus.



2 PECES

Cànula interna i externa.

1 PEÇA

Única cànula (més usada en Pediatria). També disposen d'una guia per facilitar el canvi de cànula i evitar la lesió de les mucoses.

Algunes cànules posseeixen una pilota de pneumotaponament per protegir la via aèria i evitar la sortida accidental de la cànula.

❗ El canvi de cànula ha de realitzar-se en presència d'infermeria. Cal tenir preparat el kit d'emergència.


Cures de l'estoma en el domicili



→ Fes una bona rentada de mans amb aigua i sabó.



→ La criatura ha d'estar còmoda amb el coll en extensió.




→ Tingues sempre una cànula de recanvi preparada (per si realitza una sortida accidental), l'aspirador de secrecions, l'oxigen i l'ambú.



→ Neteja l'orifici de dins cap a fora, amb una gasa estèril mullada en sèrum fisiològic. La neteja de l'estoma ha de realitzar-se una vegada al dia com a mínim.



→ La pell del coll ha de netejar-se amb aigua i sabó i mantenir-la ben seca.



→ Si la cinta del coll està humida o bruta hauràs de canviar-la en finalitzar la higiene.