

Administració de medicació

- Neteja sempre l'allargadora abans i després de la medicació.
- Els comprimits han de triturar-se, dissoldre's en aigua i administrar-se amb una xeringa.
- No barregis diferents medicacions.

Higiene bucal

- És important el raspallat diari.
- El/la nen/a ha d'estar inclinat cap endavant durant la neteja.
- Valora a més si cal fer aspiració per la boca.

Possibles complicacions

- Si es dona el cas d'una sortida accidental del botó durant els primers 4 mesos després de la intervenció quirúrgica, risc alt. Acudeix a Urgències immediatament.
- Si es dona el cas d'una sortida accidental 4 mesos després de la intervenció quirúrgica, intenta col·locar el botó de recanvi o acudeix a Urgències.
- Si s'obstrueix el botó, irriga l'allargadora amb aigua tèbia i avisa a infermeria.

❗ **Davant qualsevol complicació o signe d'alerta, avisa a l'equip de Pal·liatius Pediàtrics o acudeix a Urgències.**

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Cures del botó gàstric en el domicili



CONSELLS
PEDIÀTRICS



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona


POS PED 041 CA

Què és un botó gàstric?

És una sonda de silicona transparent que es col·loca a través de la pell de l'abdomen fins a l'estómac. Serveix per alimentar al nen/a i donar-li medicació. És un dispositiu dissenyat per a major confort i mobilitat.

L'equip d'infermeria canviarà el botó gàstric cada sis mesos.

Existeixen diferents grandàries que s'adaptaran al pacient segons vagi creixent.



Mesures d'higiene i cures

CURES DE L'ESTOMA



Neteja la zona al voltant del botó amb aigua tèbia i sabó.



Seca molt bé i amb cura la zona de voltant. Evita deixar zones humides



Si veus que està envermellit o inflammat, contacta amb infermeria.

CURES DEL BOTÓ



Gira el botó una vegada al dia. I comprova que està ben tancat si no l'utilitzes.



Infermeria verificarà el contingut del globus mensualment.



No submergeixis el botó gàstric fins a 10 dies post-IQ.



No realitzis pressió abdominal durant tres setmanes.

CURES DE LES ALLARGADORES



Abans i després de cada àpat, passa aigua per evitar les restes d'aliment en les allargadores.



Neteja externament amb aigua i sabó.

ADMINISTRACIÓ DE L'ALIMENT



- Es recomana que el/la nen/a estigui assegut/da durant l'alimentació.
- Connecta l'allargadora al botó fent coincidir la ratlla negra d'aquesta amb la del botó i gira una volta l'allargadora.
- L'administració no ha de ser ràpida i l'aliment sempre ha d'estar a temperatura ambient. Si el guardes a la nevera, l'has de treure una hora abans.
- Neteja l'allargadora una vegada finalitzada l'alimentació.