

Cures de la pell

- Vigila les zones superiors dels pavellons auriculars i la mucosa nasal, ja que existeix risc d'úlceres per pressió.
- Aplica àcids grassos hiperoxigenats (Linovera®, Corpitol®) en aquestes zones i, si apareix ferida o envermelliment, avisa a infermeria.
- No utilitzis vaselina.

CPAP


- Proporciona al/a la nen/a una pressió per mantenir la seva via aèria oberta.
- Per a col·locar-la, la millor postura serà una elevació de 45°.
- És molt important que la màscara estigui ben segellada i que no apareguin fuites.
- Per ajudar a prevenir l'aparició d'úlceres per pressió es recomana, sobre les zones de suport, l'ús diari d'àcids grassos hiperoxigenats.

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Oxigenoteràpia en el domicili



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

POS PED 042 CA



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

L'oxigenoteràpia és l'administració d'oxigen mitjançant ulleres nasals o una màscara, connectant-los a una font d'oxigen.



Oxigen líquid



L'O₂ s'emmagatzema en estat líquid a baixa temperatura (-183 °C).



La "motxilla portàtil" que es fa servir per als desplaçaments té una autonomia d'entre 4-8 hores segons el flux que precisi l'infant (usar per als desplaçaments).



L'empresa subministradora serà l'encarregada de substituir-ho quan sigui necessari; per a qualsevol incidència amb el dispositiu, avisar l'empresa.

Quan he d'administrar-ho?

Si observes alguns dels següents signes/síntomes:

- Pell o mucoses blavoses o pàl·lides.
- Respiració ràpida i irregular.
- SatO₂ <93%.
- Si en respirar se li noten molt les costelles, l'estèrnum o les clavícules.
- Si realitza "aleteig nasal".

No oblidis que...



L'oxigen és inflamable: no el col·loquis prop de fonts de calor, ni fumis al costat.



Mantingues-lo en posició vertical i en un lloc airejat.



L'aparell i els seus accessoris han d'estar nets i en bon estat.

Com cal administrar-lo?

ULLERES NASALS

- Connecta a la font d'O₂.
- Introdueix les cànules en les fosses nasals (vigilar la grandària).
- Comprova els litres programats en el tanc d'O₂.
- Mantingues les fosses nasals netes.

MÀSCARA

- Connecta a la font d'O₂.
- Col·loca la màscara sobre nas, boca i mentó de l'infant.
- Comprova els litres programats en el tanc d'O₂.
- Adapta-la a la grandària del nas (per evitar fuites).
- Comprova regularment que estigui col·locada correctament.

! Davant qualsevol complicació o signe d'alerta, avisa a l'equip de Palliatius Pediàtrics o acudeix a Urgències.