

Administració de medicació



- Evita barrejar fàrmacs.



- Els comprimits han de triturar-se i dissoldre's en aigua.



- Mai obris un comprimit d'alliberament retardat. En cas de requerir-ho, demana al personal mèdic que te'l pauti d'un altre tipus.

Administració de l'aliment

- Comprova que la SNG està ben col·locada abans de cada menjar.
- Administra l'aliment segons li hagi pautat infermeria i segons la tolerància de la criatura.
- Es recomana que el/la nen/a estigui incorporat/da durant l'alimentació.
- La velocitat de l'administració la pautarà infermeria.

❗ Davant qualsevol complicació o signe d'alerta, avisa a l'equip de Pal·liatius Pediàtrics o acudeix a Urgències.


#MésEmpatia

campus.santpau.cat



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

Cures de la criatura amb sonda nasogàstrica (SNG)




SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

CONSELLS
PEDIÀTRICS

POS PED 043 CA

Què és una sonda nasogàstrica?

És una sonda que s'introdueix pel nas, a través de la gola i l'esòfag, fins a l'estómac. Es pot usar per administrar medicaments, alimentació, o per extreure contingut gàstric.



Cures de la sonda



- Mantingues neta la part externa de la sonda.



- Infon aigua després dels menjar i/o medicació (quantitat en funció de l'edat del/de la nen/a).




- Les sondes de PVC es canviaran cada 7 dies màxim i les de PUR cada 6-8 setmanes.

Cures de nas i boca



- Mou diàriament la sonda per evitar lesions per pressió.
- Canvia l'apòsit del nas quan estigui brut (entre 2 persones).
- Neteja els orificis nasals 1 vegada al dia amb un bastonet amb aigua.
- Realitza higiene bucal diària (2 vegades al dia com a mínim).



Complicacions



OBSTRUCCIÓ O SORTIDA ACCIDENTAL DE LA SONDA

- Avisa a l'equip de pal·liatius o acudeix a l'hospital de referència.



LESIONS AL NAS

- Neteja diària amb aigua i sabó, i hidrata la zona.
- Si té envermelliment avisa a l'equip de pal·liatius.



NÀUSEES I VÒMITS

- Comprova la posició correcta de la sonda i del/de la nen/a.
- Atura la nutrició durant 1 o 2 hores. Reinicia la nutrició i, si persisteixen els vòmits, avisa a l'equip de pal·liatius pediàtrics.



TOS IRRITATIVA

- Comprova que la sonda estigui col·locada correctament.
- Avisa a l'equip de pal·liatius pediàtrics.