

Si el/la nen/a fa servir un infusor

L'infusor és un recipient amb un globus en el seu interior que pot contenir tot tipus de medicació. S'utilitza quan volem administrar una medicació concreta a un ritme lent i constant. N'hi ha de molts tipus i formes, però tots funcionen igual.



Com administrar medicació?

- Segueix sempre les instruccions del professional referent mèdic o d'infermeria.
- Neteja bé les connexions de la via abans de connectar la xeringa.
- Una vegada administrat el fàrmac, neteja la via amb 0,3ml de sèrum fisiològic.


❗ Davant qualsevol complicació o signe d'alerta, avisa al seu equip de Palliatius Pediàtrics o acudeix a Urgències.

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Cures de la via subcutània a domicili



CONSEJOS
PEDIÁTRICOS



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

POS PED 045 CA

Què és una via subcutània?

És un tub petit i molt flexible que es col·loca sota la pell per poder administrar medicació o líquids sense necessitat d'altres accessos.


Les medicacions administrades per aquesta via es van absorbint molt lentament i fan en mateix efecte que si les administréssim per un altre tipus de via.

La via subcutània o també anomenada crispeta és menys agressiva per a l'infant i li evita burxades freqüents. Li proporciona autonomia i és senzilla d'utilitzar. Té menys complicacions i efectes secundaris que altres tipus d'accessos.



Com i on es col·loca?

La crispeta s'ha de col·locar en llocs on hi hagi suficient teixit subcutani. Les habituals són les cuixes o l'abdomen. El braç només s'utilitzarà en nens/nenes majors de 2 anys.



❗ La punció ha de ser en un angle de 45°

Com fixar la via subcutània?



Col·locarem sobre la via un apòsit transparent per poder controlar l'estat de la via i la pell diàriament.



El tub restant pot fixar-se a la pell o a la roba per evitar estrebades. Si no hi ha incidències, la via pot durar de 5 a 7 dies.

Què he de vigilar?



Si la zona de punció està humida, revisa que totes les connexions estiguin ben col·locades i avisa a l'equip d'infermeria.



En el cas que hi hagi presència de sang en la crispeta, avisa a l'equip d'infermeria.



Vigila signes d'alerta com inflamació, envermelliment o augment de la temperatura local. Si es produeixen, avisa a l'equip d'infermeria.

El dia a dia



Pots fer la higiene habitual del/la nen/a, amb cura de no mullar directament el lloc on està la via. En cas de fer-ho, s'haurà de canviar l'apòsit.



Podrà realitzar les activitats habituals sempre amb cura de no donar-se estrebades o cops en la zona de punció.