

Cuidados de la piel

- Debes vigilar las zonas superiores de los pabellones auriculares y la mucosa nasal, ya que existe riesgo de úlceras por presión.
- Aplica ácidos grasos hiperoxigenados (Linovera® Corpitol®) en esas zonas y, si aparece herida o enrojecimiento, avisa a enfermería.
- No utilices vaselina.

CPAP

- Proporciona al/a la niño/a una presión para mantener su vía aérea abierta.
- Para colocarla, la mejor postura será una elevación de 45°.
- Es muy importante que la mascarilla esté bien sellada y que no aparezcan fugas.
- Para ayudar a prevenir la aparición de úlceras por presión se recomienda, sobre las zonas de apoyo, el uso diario de ácidos grasos hiperoxigenados


#MésEmpatia

campus.santpau.cat



CONSEJOS
PEDIÁTRICOS

Oxigenoterapia en el domicilio



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

POS PED 042 CS



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno mediante gafas nasales o una mascarilla, conectándolos a una fuente de oxígeno.



Oxígeno líquido



El O² se almacena en estado líquido a baja temperatura (-183°C).



La “mochila portátil” que se usa para los desplazamientos tiene una autonomía de entre 4-8 horas según el flujo que precise la criatura (usar para los desplazamientos).



La empresa suministradora será la encargada de sustituirlo cuando sea necesario; para cualquier incidencia con el dispositivo, avisar a la empresa.

¿Cuándo debo administrarlo?

Cuando observes algunos de los siguientes signos/síntomas:

- Piel o mucosas azuladas o pálidas.
- Respiración rápida e irregular.
- SatO² <93%.
- Si al respirar se le notan mucho las costillas, el esternón o las clavículas.
- Si realiza “aleteo nasal”.

No olvides que...



El oxígeno es inflamable: no lo coloques cerca de fuentes de calor, ni fumes cerca.



Mantenlo en posición vertical y en un lugar aireado.



Mantén el aparato y sus accesorios limpios y en buen estado.

¿Cómo hay que administrarlo?

GAFAS NASALES

- Conecta a la fuente de O².
- Introduce las cánulas en las fosas nasales (vigila el tamaño).
- Comprueba los litros programados en el tanque de O².
- Mantén las fosas nasales limpias.

MASCARILLA

- Conecta a la fuente de O².
- Coloca la mascarilla sobre nariz boca y mentón del/de la niño/a.
- Comprueba los litros programados en el tanque de O².
- Adáptala al tamaño de la nariz (evitar fugas).
- Comprueba regularmente que esté colocada correctamente.

❗ **Ante cualquier complicación o signo de alerta, avisa al equipo de Paliativos Pediátricos o acude a Urgencias.**