

Administración de medicación



- Evita mezclar fármacos.



- Los comprimidos deben triturarse y disolverse con agua.



- Nunca abras una cápsula de liberación retardada. Contacta con el equipo de paliativos si tienes dudas con la administración.

Administración del alimento

- Comprueba que la SNG está bien colocada antes de cada comida.
- Dale el alimento según le ha pautado enfermería y según la tolerancia del/la niño/a.
- Se recomienda que la criatura esté incorporada durante la alimentación.
- La velocidad de administración la pautará enfermería.

❗ **Ante cualquier complicación o signo de alerta, avisa al equipo de Paliativos Pediátricos o acude a Urgencias.**


#MésEmpatia

campus.santpau.cat



CONSEJOS
PEDIÁTRICOS

Cuidados de la criatura con sonda nasogástrica (SNG)



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona


POS PED 043 CS



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

¿Qué es una sonda nasogástrica?

Es una sonda que se introduce por la nariz, a través de la garganta y el esófago, hasta el estómago. Se puede usar para administrar medicamentos, alimentación o para extraer contenido gástrico.



Cuidados de la sonda



- Mantén limpia la parte externa de la sonda.



- Infunde agua después de las comidas y/o medicación (cantidad en función de la edad del/la niño/a).




- Las sondas de PVC se cambiarán cada 7 días máximo y las de PUR cada 6-8 semanas.

Cuidados de la nariz y la boca



- Mueve diariamente la sonda para evitar lesiones por presión.
- Cambia el apósito de la nariz cuando esté sucio (entre 2 personas).
- Limpia los orificios nasales 1 vez al día con un bastoncillo con agua.
- Realiza higiene bucal diaria (2 veces al día como mínimo).



Complicaciones



OBSTRUCCIÓN O SALIDA ACCIDENTAL DE LA SONDA

- Avisa al equipo de paliativos o acude al hospital de referencia.



LESIONES EN LA NARIZ

- Limpia diariamente con agua y jabón e hidrata la zona.
- Si tiene enrojecimiento, avisa al equipo de paliativos.



NÁUSEAS Y VÓMITOS

- Comprueba la posición correcta de la sonda y del/de la niño/a.
- Para la nutrición durante 1 o 2 horas. Reinicia la nutrición y, si persisten los vómitos, avisa al equipo de paliativos pediátricos.



TOS IRRITATIVA

- Comprueba que la sonda esté colocada correctamente.
- Avisa al equipo de paliativos pediátricos.