

Complicaciones



VÓMITOS

Coloca a la criatura de lado y evita que el vómito entre por la cavidad de la traqueostomía. Lleva a cabo una aspiración del vómito.



IRRITACIÓN DEL ESTOMA

Si observas que la piel de alrededor está roja, inflamada o caliente, debes llamar a la enfermería.



MAL OLOR

Si percibes mal olor del estoma o de la cánula, avisa a enfermería.



SALIDA ACCIDENTAL DE LA CÁNULA

Introduce suavemente una nueva cánula, sin forzar. Si el/la niño/a lo precisa, adminístrale oxígeno.

❗ Ante cualquiera de estas complicaciones comunicar al equipo de Paliativos Pediátricos o acude a Urgencias.

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Cuidados de la traqueostomía en el domicilio



CONSEJOS
PEDIÁTRICOS



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

POS PED 044 CS




SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

¿Qué es una traqueostomía?

Ciertas enfermedades afectan al mecanismo de la respiración de los/de las niños/as y precisan de vía de entrada de aire que no sea la nariz ni la boca. Esta vía de entrada es la traqueostomía.


Una traqueostomía es un orificio (estoma) que se realiza en la tráquea del niño para comunicarla con el exterior y permitirle respirar a través de él.

En éste estoma se coloca un tubo que permite la entrada y salida de aire.



Tipos

En función de la finalidad y de la duración de la traqueostomía existen diferentes tipos.



2 PIEZAS

Cánula interna y externa.

1 PIEZA

Única cánula (más usadas en Pediatría). También disponen de una guía para facilitar el cambio de cánula y evitar la lesión de las mucosas.

Algunas cánulas poseen un balón de neumotaponamiento, para proteger la vía aérea y evitar la salida accidental de la cánula.

❗ El cambio de cánula debe realizarse en presencia de enfermería. Es necesario tener preparado el kit de emergencia.

Cuidados del estoma en el domicilio



→ Haz una buena higiene de manos con agua y jabón.



→ La criatura debe estar cómoda con el cuello en extensión.




→ Ten siempre una cánula de repuesto preparada (por si realiza una salida accidental), el aspirador de secreciones, el oxígeno y el ambú.



→ Limpia el estoma de dentro hacia afuera, con una gasa estéril mojada en suero fisiológico. La limpieza del estoma ha de realizarse una vez al día como mínimo.



→ La piel del cuello debe limpiarse con agua y jabón y mantenerla bien seca.



→ Si la cinta del cuello está húmeda o sucia se deberá cambiar al finalizar la higiene.